



### Name

#### Equitop Pronutrin®

Ergänzungsfutter für Pferde  
Zur Unterstützung einer normalen Magen-  
funktion

### Zusammensetzung

#### Bestandteile

Getrockneter Zitrustrester, Zucker, Weizen-  
faser, Erbsenfaser, getrockneter Apfeltrester,  
Glycerol

#### Zusatzstoffe

Lecithin, Glycerin, natürliche Geschmacks-  
stoffe

#### Inhaltsstoffe

Rohfaser	13,5 %
Rohöl und -fette	9,0 %
Rohprotein	5,7 %
Rohasche	2,7 %
Natrium	0,1 %

### Fütterungsempfehlung

1x täglich 50 g pro 100 kg Körpergewicht  
mit dem Krippenfutter vermischt. Bei ver-  
zögerter oder schlechter Futteraufnahme  
kann die Gabe auf 2x täglich 25 g pro 100 kg  
Körpergewicht verteilt oder zur Gewöhnung  
anfangs halbiert und über 2 bis 3 Tage bis  
zur empfohlenen Menge gesteigert werden  
(Messbecher innenliegend).

Bei Saugfohlen wird die erforderliche Menge  
Equitop Pronutrin® mit der 3-fachen Menge  
lauwarmen Wasser vermischt. Nach 2 bis  
3 Minuten kann der entstehende Brei dem  
Fohlen mit einer Spritze oder Plastikflasche  
direkt ins Maul verabreicht werden.

Pferden, die krankheitsbedingt die Futterauf-  
nahme verweigern, kann Equitop Pronutrin®  
vorübergehend vom Tierarzt eingegeben  
werden.

Equitop Pronutrin® soll über einen Zeitraum  
von mindestens 2 Wochen verabreicht  
werden. Hat sich der Zustand des Pferdes

normalisiert oder gebessert, sollte die Diät  
trotzdem weitere 2 Wochen fortgesetzt  
werden, um das Rückfallrisiko zu verrin-  
gern. Bei Bedarf ist auch eine Dauer- oder  
Intervallverabreichung möglich. Über even-  
tuell notwendige Zusatzmaßnahmen (z. B.  
bezüglich Haltung, Training, Fütterung) oder  
auch eine medikamentelle Therapie muss  
der Tierarzt entscheiden.

### Hinweise zur sachgerechten Anwendung

Zur Unterstützung einer normalen Magen-  
Darm-Funktion, z. B. während oder vor

- hoher Leistungsbeanspruchung
- hochkonzentrierten Kraftfuttergaben
- Futterwechsel
- Futterentzug oder Futterverweigerung
- Transport
- Absetzen von Fohlen
- Rangordnungskonflikten
- Operationen

und in anderen Situationen, in denen ein  
allgemeiner Bedarf an zusätzlichen Nähr-  
stoffen zur Unterstützung der Magen-  
schleimhaut nötig sind. Wissenschaftliche  
Studien und umfangreiche Feldstudien in  
Deutschland und Skandinavien belegen  
den positiven Einfluss einer diätetischen  
Zufütterung von Equitop Pronutrin® bei  
klinischer Symptomatik oder gastrokopi-  
schem Nachweis von Magenschleimhaut-  
erosionen und -ulzera. Eine Equitop  
Pronutrin®-Diät ist deshalb immer dann  
angezeigt, wenn gastrokopsch Magen-  
schleimhautläsionen diagnostiziert oder  
nach Ausschluss anderer Ursachen  
folgende klinische Verdachtssymptome  
festgestellt werden:

- schlechter Allgemeinzustand
- Gewichtsverlust
- Leistungsminderung
- apathisches Verhalten
- geringer oder selektiver Appetit
- Durchfall
- weicher oder fester Kot
- rezidivierende oder postprandiale Koliken
- Bruxismus (Leerkauen, Zähneknirschen)
- Ruktus
- häufiges Flehmen
- Foetor ex ore

Zur Vermeidung von Rückfällen oder vor bekannten Stresssituationen kann Equitop Pronutrin® auch vorbeugend gefüttert werden.

#### Lagerungshinweise

Stets gut verschlossen lagern, Inhalt vor Feuchtigkeit, Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 25°C schützen.

#### Datum der Information

November 2021

#### Packungsgrößen

3,5-kg-Eimer

#### Weitere Angaben

Equitop Pronutrin® enthält keine doping-relevanten Substanzen. Es kann ohne Bedenken vor und während eines Wettkampfes verabreicht werden. Ein wichtiger Bestandteil in Equitop Pronutrin® ist Apolectol®, ein Pektin-Lecithin-Glycerin-Komplex. Equitop Pronutrin® enthält 77% Apolectol®. Die Pektine wirken der Übersäuerung des Mageninhalts entgegen, indem sie die postprandiale pH-Wert-Erhöhung verlängern und den Gallensäure-Reflux hemmen. Gleichzeitig stabilisieren Pektine den natürlichen Schleim. Die Lecithin-Glycerin-Komponente verstärkt die hydrophobe Schutzschicht der Magenschleimhaut. So schützt Apolectol® die empfindliche Schleimhaut zweifach und auf natürliche Weise.

